

Prečítajte si a uschovajte si tento leták
CO JE KEDY MOŽE POUŽIŤ?
KIT "V-VEIL UP"?

KIT V-Veil UP2, pomôcka na ster v vaginu používna na odber rôznych tekutin a látok z vaginálnej dutiny a krčka maternice na diagnostické laboratórne testy.

UPOZORNENIE: Tento KIT sa môže používať počas krvácania, tehotenstva alebo po syndróme toxickejho šoku len na odporúčanie lekárky.

OBSAH:
• 1 KIT V-Veil UP2, pomôcka na ster v vaginu, ktorá je dezinfectovaná UVC, nesterilná, zdravotnícka pomôcka triedy I

• 1 Návod na použitie

• 1 Nádoba na skladovanie a prepravu vzoriek.

Potrebné sú stopy, ktoré nie sú súčasťou súpravy.

ODPORÚČANIA A RADY:

• Pred použitím tohto KIT-u si umyte ruky.

• Nepoužívajte ho, ak ste mali v posledných 2 dňoch sexuálnu aktivitu.

• Nepoužívajte ho, ak ste už myli vaginálnu dutinu v posledných 48 hodínach.

• Ak ste tehotná alebo máte krv v vaginálnej dutine, používajte túto súpravu podľa návodu na ster v vaginu.

• Pomôcka by nemala zostať v poľve dĺžku ako 30 minút, ale ak ju zabudnete vybrať, odstráňte ju hneď, ak so skompenzujete.

• Používajte vždy len jeden pomôcku.

• Pomôcka sa nemá používať opakovane, ani keď nie je impregnovaná.

• Dášne odporúčaná ziskate od svojho lekára, gynekologa alebo lekárky.

KOMU JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ TENTO VÝROBOK?

Znenie, ktoré:

• majú horúčku alebo príznaky podobné chřipce, dokonca aj

miere.

• už počasného syndrómu toxickejho šoku a nemajú odporúčanie od odborného lekára na vykonanie testu.

• sú alergické na plasty a ich deriváty.

• sú mladšie ako 18 rokov, bez súlasmu rodičov/a alebo lekárky.

• sú úmyselné neprečítaní. Nároky na použitie alebo neceptovali informovany súťažsia laboratórii.

• krvácanie a neopracovanie súčtu od lekára na vykonanie testu.

• sú tehotné a nemajú odporúčanie od lekára na vykonanie testu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O SYNDRÓME TOXICKÉHO ŠOKU:

Podľa WHO je syndróm toxickejho šoku (TSS) vyskyt, ktorý postupne dôstupne a životne ohrozenie súčtu, ktoré je spôsobené toxínom produkovaným bakteriám (stafylokokom), ktorá sú veľmi vyskytne v tele. Polovičia dôstupného primárového TSS sa vyskytuje u dospevajúcich v čase počas menstruácie. Syndrom sa spája s používaním tamponov, ale možno sa vyskytne aj pri používaní iných ochranných produktov.

Syndrom je charakterizovaný vysokým systémickým vysokým tlakom.

• vysokým systémickým tlakom.